



Circ. n. 104
Prot. 2429VII.7

Verona 28/03/2019

OGGETTO: SEGNALAZIONE SANITARIA

Si comunica che si sono manifestati alcuni casi di pediculosi.

L'ASL, è noto, non interviene in questi casi ma fornisce un documento informativo, utile alle famiglie e al personale, che si riporta sotto.

Si raccomanda a tutti un controllo accurato del fenomeno.

Grazie e cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Luigi Franco

La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs 39/1993

PEDUCOLOSI DEL CAPO

La pediculosi del capo è, fra le parassitosi umane, la più diffusa e comune nei paesi occidentali, e tutto ciò nonostante il buon livello igienico delle persone e degli ambienti di vita.

Talvolta focolai epidemici si possono verificare in piccole comunità (scuole, centri di vacanza, caserme) peraltro facilmente sradicabili se prontamente identificati e opportunamente trattati.

- *Il pediculus adulto ha colore grigio-marrone, possiede tre paia di zampe ed ha una lunghezza di 2 - 4 mm.*
- *Le uova (lendini) deposte dalla femmina in numero di 6 - 8 al giorno durante l'intero ciclo vitale del parassita (circa un mese) hanno forma ovoidale e colore traslucido.*
 - *Vengono appese alla base del capello e dopo circa sette giorni si schiudono liberando le larve che attraverso fasi intermedie di maturazione raggiungono lo stadio adulto.*
 - *Le uova dopo la fuoriuscita del parassita rimangono tenacemente attaccate al capello e seguendone la crescita si allontanano lentamente dalla base dello stesso.*
- *Scaglie dermiche (forfora, ecc.) possono a prima vista essere confuse con le uova del pidocchio ma a differenza di queste è possibile rimuoverle facilmente dal capello.*
- *Il parassita adulto si nutre suggendo il sangue dell'ospite passando inizialmente del tutto inosservato; solo dopo qualche tempo compare un prurito intenso.*
- *In questo caso va innanzitutto verificato che non si tratti di altra affezione pruriginosa del cuoio capelluto (eczemi, dermatite, micosi,...) avendo cura di esaminare soprattutto la regione superiore del capo e retroauricolare.*
- *All'esame diretto, in caso di parassitosi, anche con l'uso di una lente di ingrandimento è assai improbabile riscontrare il parassita adulto mentre è comune identificare le uova aderenti alla base del capello.*
- *La trasmissione avviene per il passaggio diretto da un individuo all'altro, e benché le capacità di sopravvivenza del parassita lontano dall'ospite siano assai limitate, possono concorrere alla trasmissione anche indumenti (berretti) e oggetti d'uso personale (pettini, asciugamani, cuscini).*
- *Come erroneamente si pensa, la lunghezza dei capelli non ha influenza alcuna sulla diffusione della infestazione.*
- *La pratica di rasare la testa non porta alcun vantaggio alla cura della pediculosi.*
- *Questa consiste nell'utilizzo di specifici prodotti antiparassitari (shampoo, polvere, lozione) la cui applicazione si consiglia di ripetere una seconda volta dopo circa sette giorni dal primo trattamento.*
- *Questo schema consente di distruggere i parassiti fuoriusciti nel frattempo dalle uova in quanto le larve al loro interno possono resistere all'azione dei farmaci.*
- *Gli oggetti di uso personale andranno lavati con antiparassitari; indumenti, lenzuola, asciugamani possono essere lavati a secco o con acqua a temperatura superiore a 6.*